KIT CONTENTS

a. Plasma separation card
b. Label



c. Lancets
d. Disinfectant wipes

e. Adhesive dressing
f. Swab

g. EDTA-coated capillary tubes
h. Protective packaging





GENERAL NOTES FOR SAMPLE COLLECTION

Choose your non-dominant hand for sample collection.

Either the middle- or ring finger is most suitable for blood collection. The little finger is unsuitable due to the risk of injury.

You are welcome to contact us with any queries:
either by email under info@sanobis.health or by phone under +49 6172 95 94 560.

You may also refer to our FAQs.

PREPARATION

Please read the instructions carefully.

Wash your hands with soap and water prior to sample collection.

Affix the label to the plasma separation card.

Position the label on the card as indicated in the picture below.

For easier sample collection hold your chosen hand under warm water for two minutes while clenching and unclenching your fist.

Disinfect the middle and ring finger of your chosen hand with a disinfectant wipe and subsequently allow the hand to dry for 30 seconds.

SAMPLE COLLECTION



← Carefully remove the safety pin of the lancet device.

→ Apply the lancet device tightly to the left or right side of the fingertip of the disinfected finger and press the device tightly against the finger to trigger the lancet.





← Apply the capillary tube with a slight downward angle directly below the skin puncture site to the blood drop without pressing on the colored stopper. The capillary tube should not touch the skin. Blood will flow on its own into the capillary tube. Should the blood flow be too strong, wipe the blood away with the provided swab. As soon as a new blood drop has formed you can reapply the capillary tube.

← Fill the capillary tube completely up to the white marking with blood, without allowing air bubbles to form and place the filled capillary tube on a clean surface. Repeat the process for the second capillary tube.

If there is insufficient blood flow to collect a second sample, an additional skin puncture site will be needed. Please use the second provided lancet device for this.

→ Position a filled capillary tube above the first reaction area of the plasma separation card. The card may not be touched by the capillary tube.

Now depress the colored stopper of the capillary tube and allow all the blood in the tube to drop onto the first reaction area.





← Empty the contents of the second capillary tube onto the second reaction area as described in 5. Ensure that both reaction areas on the card are filled completely!

Let the plasma separation card lie flat and allow the blood to dry out completely overnight. Do not use additional heat sources to accelerate the drying process.

PACKING & SHIPPING THE SAMPLE

Place the dry plasma separation card in the transparent protective packaging with absorbent liner and drying bag and remove excess air.

Remove the white adhesive strip at the opening of the packaging and close the package.

Place the sealed protective packaging containing the plasma separation card in in the preaddressed shipping box (without the banner) and close it.

Mail the closed shipping box on the same day.

GENERAL INFORMATION

The sample will be processed in the laboratory immediately upon receipt.

You will be informed by us as soon as the results are ready.

Upon request we can support and advise you on your test result.

You can find more information on the tests and pathogens on www.sanobis.health

sanobis health

sanobis GmbH
Zeppelinstr 24

61352 Bad Homburg
vor der Höhe

Questions & Service:
info@sanobis.health

sanobis health

ANLEITUNG

Blut-Abnahme Set.



DE

INHALT

a. Plasma Separation Card
b. Etikett

a.



b.

c. Lanzetten
d. Desinfektionstücher

c.

d.

e. Pflaster
f. Tupfer

e.

f.

g. EDTA-beschichtete Kapillaren
h. Schutzverpackung

g.



h.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR PROBEN-NAHME

Wählen Sie zur Probenentnahme die Hand, die Sie weniger benutzen.

Für die Blutentnahme eignet sich am besten der Mittel- und Ringfinger. Der kleine Finger ist ungeeignet, es besteht Verletzungsgefahr.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden:
entweder per Mail an info@sanobis.health oder per Telefon unter +49 6172 95 94 560

Schauen Sie auch in unsere FAQs.

VORBEREITUNG

Lesen Sie sorgfältig diese Anleitung durch.

Waschen Sie sich vor Probennahme mit Wasser und Seife die Hände.

Bekleben Sie die Plasma Separation Card mit dem Etikett.

Positionieren Sie das Etikett auf dem Beschriftungsfeld der Plasma Separation Card wie auf der Abbildung gezeigt.

Für eine leichtere Probenentnahme halten Sie Ihre ausgewählte Hand 2 Minuten unter warmes Wasser und öffnen und schließen Sie anschließend mehrfach Ihre Faust.

Desinfizieren Sie den Mittel- oder Ringfinger Ihrer ausgewählten Hand mit einem Desinfektionstuch und lassen Sie die Hand anschließend für 30 Sekunden trocknen.

PROBENENTNAHME



← Entfernen Sie vorsichtig den Sicherheitsstift der Lanzette.

→ Setzen Sie die Lanzette fest auf die linke oder rechte Seite der Fingerkuppe des desinfizierten Fingers auf und drücken Sie die Lanzette zum Auslösen fest auf den Finger.





← Setzen Sie die Kapillare leicht nach unten geneigt direkt unterhalb der Einstichstelle am Blutstropfen an ohne den farbigen Stöpsel zu drücken. Die Kapillare sollte die Haut nicht berühren. Das Blut fließt von allein in die Kapillare. Bei zu starkem Blutfluss wischen Sie das Blut mit dem Tupfer ab. Sobald sich ein neuer Tropfen gebildet hat, können Sie die Kapillare wieder ansetzen.

← Füllen Sie die Kapillare vollständig bis zur weißen Markierung möglichst ohne Luftbläschen mit Blut und legen Sie die befüllte Kapillare auf eine saubere Oberfläche. Wiederholen Sie den Schritt 2 für die zweite Kapillare.

Sollte sich an der Einstichstelle kein Blutstropfen mehr bilden wird für die zweite Kapillare eine weitere Einstichstelle benötigt. Dafür verwenden Sie bitte die zweite beigefügte Lanzette.

→ Positionieren Sie eine gefüllte Kapillare oberhalb des ersten Reaktionsbereichs der Plasma Separation Card. Die Plasma Separation Card darf nicht mit der Kapillare berührt werden.

Drücken Sie langsam den farbigen Stöpsel der Kappilare herunter und tropfen Sie das gesamte Blut der ersten Kapillare langsam auf den ersten Reaktionsbereich.



← Tropfen Sie, wie unter 5. beschrieben, den vollständigen Inhalt der zweiten Kapillare auf den zweiten Reaktionsbereich der Plasma Separation Card. Befüllen Sie zwei Reaktionsfelder der Plasma Separation Card vollständig! Lassen Sie die Plasma Separation Card flach liegen und lassen Sie das Blut über Nacht vollständig trocknen. Verwenden Sie keine zusätzlichen Wärmequellen, um das Trocknen zu beschleunigen.

VERPACKEN & VERSCHICKEN DER PROBE

Die getrocknete Plasma Separation Card in die transparente Schutzverpackung mit Saugeinlage und Trocknungsbeutel legen und die überschüssige Luft hinaus drücken.

Den weißen Streifen an der Öffnung entfernen und die Schutzverpackung verschließen.

Den verschlossenen Schutzbeutel mit der Plasma Separation Card in den voradressierten und frankierten Rücksendekarton legen und den Karton verschließen.

Den befüllten Rücksendekarton (ohne Banderole) am selben Tag in den Briefkasten werfen.

ALLGEMEINE INFORMA-TIONEN

Nach Eingang Ihrer Probe bei uns im Labor beginnen wir umgehend mit der Bearbeitung.

Wir informieren Sie, sobald das Ergebnis vorliegt.

Auf Wunsch können wir Sie mit Ihrem Ergebnis unterstützen und beraten.

Mehr Informationen zu den Tests und Erregern finden Sie unter www.sanobis.health

sanobis health

sanobis GmbH
Zeppelinstr 24

61352 Bad Homburg
vor der Höhe

Fragen & Beratung:
info@sanobis.health

sanobis health

INSTRUCTIONS

Blood collection kit.



EN